




Produktywność odmian tytoniu Virginia wyhodowanych w IUNG-PIB, w porównaniu z odmianą kontrolną Wiślica, w doświadczeniu polowym ścisłym w Woli Przybysławskiej woj. lubelskie w 2025 roku




Ryc.1. Średnia wysokość roślin odmian IUNG-PIB w porównaniu do odmiany kontrolnej (Wiślica).




Ryc. 2. Średnia liczba liści na roślinach odmian IUNG-PIB w porównaniu do odmiany kontrolnej (Wiślica).




Ryc. 3. Średnia powierzchnia liścia środkowego odmian IUNG-PIB w porównaniu do odmiany kontrolnej (Wiślica)




Ryc. 4. Średni plon liści w t/ha z odmian IUNG-PIB w porównaniu do odmiany kontrolnej (Wiślica). Skrajny prawy słupek oznacza wartość najmniejszej istotnej różnicy wyliczoną na podstawie testu wielokrotnych porównań Tukey'a.



Ryc. 5. Średni łączny udział I, II i III klasy wykupowej w plonie odmian IUNG-PIB w porównaniu do odmiany kontrolnej (Wiślica). Skrajny prawy słupek oznacza wartość najmniejszej istotnej różnicy wyliczoną na podstawie testu wielokrotnych porównań Tukey'a.



Ryc. 5. Średni przychód brutto z powierzchni 1 ha uprawy odmian IUNG-PIB w porównaniu do odmiany kontrolnej (Wiślica). Skrajny prawy słupek oznacza wartość najmniejszej istotnej różnicy wyliczoną na podstawie testu wielokrotnych porównań Tukey'a



Ryc. 6. Zawartość nikotyny i cukrów redukujących w suchej masie liści odmian IUNG-PIB w porównaniu do odmiany kontrolnej (Wiślica).